

LIITE 4. Sanginjoen atlasaineistossa esiintyvät vanhojen kuusi- ja mäntyvaltaisten metsien indikaattorisienilajit (Kotiranta & Niemelä 1996).* = muuhun sieniryhmään kuin kääpiin kuuluva laji

Kuusivaltaisten metsien indikaattorilajit:

Oravuotikka (*Asterodon ferruginosus**)
Rusokantokääpä (*Fomitopsis rosea*)
Punahäivekääpä (*Leptoporus mollis*)
Pihkakääpä (*Onnia leporina*)
Korkkikerroskääpä (*Perenniporia subacida*)
Kuusenkääpä (*Phellinus chrysoloma*)
Ruostekääpä (*Phellinus ferrugineofuscus*)
Pikireunakääpä (*Phellinus lundellii*)
Aarnikääpä (*Phellinus nigrolimitatus*)
Riukukääpä (*Phellinus viticola*)
Istukkakääpä (*Rhodonía placenta*)
Korpiludekääpä (*Skeletocutis odora*)

Mäntyvaltaisten metsien indikaattorilajit:

Harsukääpä (*Anomoporia kamtschatica*)
Kermakarakääpä (*Junghuhnia luteoalba*)
Punahäivekääpä (*Leptoporus mollis*)
Viinikääpä (*Meruliopsis taxicola*)
Korokääpä (*Oligoporus sericeomollis*)
Aarnikääpä (*Phellinus nigrolimitatus*)
Männynkääpä (*Phellinus pini*)
Riukukääpä (*Phellinus viticola*)
Ruskohaprakääpä (*Postia leucomallella*)
Kultarypykkä (*Pseudomerulius aureus**)
Aihkirypykkä (*Phlebia cornea**)