

LIITE 4. Sanginjoen atlasaineistossa esiintyvät vanhojen kuusi- ja mäntyvaltaisten metsien indikaattorisienilajit (Kotiranta & Niemelä 1996).\* = muuhun sieniryhmään kuin kääpiin kuuluva laji

**Kuusivaltaisten metsien indikaattorilajit:**

Oravuotikka (*Asterodon ferruginosus\**)  
Rusokantokääpä (*Fomitopsis rosea*)  
Punahäivekääpä (*Leptoporus mollis*)  
Pihkakääpä (*Onnia leporina*)  
Korkkikerroskääpä (*Perenniporia subacida*)  
Kuusenkääpä (*Phellinus chrysoloma*)  
Ruostekääpä (*Phellinus ferrugineofuscus*)  
Pikireunakääpä (*Phellinus lundellii*)  
Aarnikääpä (*Phellinus nigrolimitatus*)  
Riukukääpä (*Phellinus viticola*)  
Istukkakääpä (*Rhodonía placenta*)  
Korpiludekääpä (*Skeletocutis odora*)

**Mäntyvaltaisten metsien indikaattorilajit:**

Harsukääpä (*Anomoporia kamtschatica*)  
Kermakarakääpä (*Junghuhnia luteoalba*)  
Punahäivekääpä (*Leptoporus mollis*)  
Viinikääpä (*Meruliopsis taxicola*)  
Korokääpä (*Oligoporus sericeomollis*)  
Aarnikääpä (*Phellinus nigrolimitatus*)  
Männynkääpä (*Phellinus pini*)  
Riukukääpä (*Phellinus viticola*)  
Ruskohaprakääpä (*Postia leucomallella*)  
Kultarypykkä (*Pseudomerulius aureus\**)  
Aihkirypykkä (*Phlebia cornea\**)